

PRODUCT	Echinacea liquid	
PRODUCT NUMBER OF NATURAL HEALTH	NPN 80047963	
QUANTITY	150 mL	Honey Flavour
INDICATIONS	<i>Supportive therapy in the treatment of upper respiratory tract infections (e.g. common colds). Helps to relieve the symptoms and shorten the duration of upper respiratory tract infections.</i>	
MEDICINAL INGREDIENT (per dose unit 5 mL)	Echinacea (echinacea purpurea, root) ----- 1000 mg	
DIRECTIONS	2-4 years: ½ teaspoon (2.5 mL) 1 time per day 5-9 years: ½-1 teaspoon (2.5-5 mL) 1 time per day 10-14 years: ½-2 teaspoon(s) (2.5-10 mL) 1 time per day 15 and over: 1 teaspoon (5 mL) 1-3 time(s) per day <i>Take at the first sign of infection. Shake well before use. For use beyond 8 weeks, consult a health care practitioner.</i>	
CAUTIONS AND WARNINGS	IF YOU HAVE A PROGRESSIVE SYSTEMIC DISEASE SUCH AS TUBERCULOSIS, COLLAGENOSIS, MULTIPLE SCLEROSIS, AIDS AND/OR HIV INFECTION, OR AN AUTOIMMUNE DISORDER, CONSULT A HEALTH CARE PRACTITIONER PRIOR TO USE. IF YOU ARE TAKING IMMUNOSUPPRESSANTS, CONSULT A HEALTH CARE PRACTITIONER PRIOR TO USE. IF SYMPTOMS PERSIST OR WORSEN, CONSULT A HEALTH CARE PRACTITIONER. KNOWN ADVERSE REACTIONS: RARE CASES OF SEVERE ALLERGIC REACTIONS HAVE BEEN KNOWN TO OCCUR; USE CAUTION IF YOU ARE ALLERGIC TO PLANTS OF THE DAISY FAMILY.	

PRODUIT	Echinacée liquide	
NUMÉRO DE PRODUIT DE SANTÉ NATUREL	NPN 80047963	
QUANTITÉ	150 mL	Saveur de miel
INDICATIONS	<i>Thérapie de soutien pour le traitement des infections des voies respiratoires supérieures (par exemple, le rhume). Aide à soulager les symptômes et réduire la durée des infections des voies respiratoires supérieures.</i>	
INGRÉDIENT MÉDICINAL (par dose unitaire 5 mL)	Echinacée (Echinacée Purpurea racine) ----- 1000 mg	
MODE D'EMPLOI	2-4 ans: ½ cuillère à thé (2,5 mL) 1 fois par jour 5-9 ans: ½ -1 cuillère à thé (2,5-5 mL) 1 fois par jour 10-14 ans: ½ -2 cuillère(s) à thé (2,5-10 mL) 1 fois par jour 15 et plus: 1 cuillère à thé (5 mL) 1 à 3 fois par jour <i>Prenez dès les premiers signes de l'infection. Bien agiter avant usage. Pour une utilisation au-delà de 8 semaines, consulter un praticien de soins de santé.</i>	
MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS	SI VOUS AVEZ UNE MALADIE SYSTÉMIQUE PROGRESSIVE TELLE QUE LA TUBERCULOSE, LA COLLAGÉNOSE, LA SCLÉROSE EN PLAQUES, L'INFECTION DU SIDA ET/OU LE VIH, OU UNE MALADIE AUTO-IMMUNE, CONSULTER UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ AVANT D'UTILISER. SI VOUS PRENEZ DES IMMUNOSUPPRESSEURS, CONSULTER UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ AVANT D'UTILISER. SI LES SYMPTÔMES PERSISTENT OU S'AGGRAVENT, CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ. RÉACTIONS INDÉSIRABLES CONNUES: DE RARES CAS DE RÉACTIONS ALLERGIQUES SÉVÈRES ONT ÉTÉ CONNUS DE SE PRODUIRE; FAIRE PREUVE DE PRUDENCE SI VOUS ÊTES ALLERGIQUE AUX PLANTES DE LA FAMILLE DES MARGUERITES.	